

	患部の状態	アフターケア	処方薬	ご来院	清潔	日常生活	注意点
手術当日	目の上の腫れがあります。瞼の重い感じがありますが、麻酔の影響によるものですので時間の経過と共に軽減していきます。	痛みに対しては、痛み止めでコントロールして下さい。	腫れ止め (1日3回毎食後) 痛み止め (痛い時のみ) 点眼薬 (炎症止め)	手術 	顔を濡らさないようにしてシャワーを浴びることができます。	目が疲れやすくなっておりますので、ご帰宅後はゆっくりお休み下さい。今日は、お疲れ様でございました。	痛みや熱感が強い場合には、目を濡らさないようにして1日冷やして下さい。飲酒は2~3日間は控えめに・・・
1日目					洗髪、洗顔、入浴、メイクが可能となります。	腫れが落ち着くまでの間は、サングラスの着用をおすすめ致します。	
2日目							
3日目	内出血が出る場合がありますが、2週間程度でなくなりますのでご安心下さい。	目ヤニを取る際、点眼を行なって頂いてからの方が取れやすくなります。				コンタクトレンズのご使用が可能となります。	※コンタクトレンズ装着時は、炎症止めの点眼薬はご使用なさらないようにして下さい。コンタクト用(ドライアイ)の点眼薬をご使用下さい。
4日目			お薬はなくなり次第終了となります。				
5日目							
6日目							

7 日 目	腫れは徐々に 落ち着いてき ます。 痛みは落ち着 いてきます。						
1 ヶ 月 目	手術後の腫れ もなくなり、 より自然な感 じになります。			1ヶ月 検診			腫れは、左 右対称では ないので自 然なライン となるまで に1ヶ月程 お待ち下さ い。

お電話でのご予約、ご相談はこちらから ~全国共通フリーコール 受付カウンセラー直通~

 **0120-911-935** 9:30~20:00 土日祝も受付
  **0120-773-566** 20:00~23:00 新規予約限定・夜間